

# もも・ネクタリン特報

⑩

令和6年8月16日  
JA中野市営農センター  
JA中野市りんご・もも部会

8月上旬の散布薬剤については、8/2配布の特報No.⑩をご確認ください。  
除袋遅れには十分注意して下さい。（除袋目安：収穫10～14日前に実施）  
次面には、もも第12回以降【極晩生種】特別散布を記載しています。



## 【もも】 第12回 薬剤散布

散布時期	8月下旬 目安：8/25～8/30頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ	散布量	ℓ
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	ベルコートフロアブル	50ml（前日、3回）		
	アーデントフロアブル	50ml（前日、3回）		
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類			
散布量	10a当たり：500ℓ			
注意事項	①有袋品種は、除袋後に散布する。			

## 【ネクタリン】 第12回 薬剤散布

散布時期	8月下旬 目安：8/25～8/30頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ	散布量	ℓ
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	ベルコートフロアブル	50ml（前日、2回）		
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病			
散布量	10a当たり：500ℓ			
注意事項	【もも混植園】シンクイムシ類対策 ・アーデントフロアブルの2,000倍（前日、3回）を加用する。			

次回特報配布日  
9月3日（予定）

# 【もも極晩生種】

## 特別散布薬剤

散布時期	9月中旬 目安：9/10～9/15頃	散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり		
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml		
	【殺菌剤】 オンリーワンフロアブル	50ml（前日、3回）		
	【殺虫剤】（どちらかを選択） ①モスピラン顆粒水溶剤	50g（前日、3回）		
	②イカズチWDG	66g（前日、5回）		
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモブシス腐敗病 シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類、モモハモグリガ等			
散布量	10a 当たり：500ℓ			
注意事項	①有袋品種は、除袋後に散布する。			

### 【晩生種～極晩生種】収穫開始予想

直前の気象条件によって前後しますが、下表を参考に園地内の果実状況を見て収穫を判断して下さい。

早生種（あかつき）、中生種（なつっこ）等の経過を見ると、収穫前の降雨・湿度高により果肉先行となっている状況です。そのため、晩生種以降の品種も成熟が進む可能性があるため、糖度・着色を待ちすぎず熟度を優先して収穫を進めて下さい。

※収穫前に必ず食味・糖度チェックをし収穫を進めて下さい。

品種名	南部地区	平岡地区
幸茜	9/1頃	9/3頃
さくら白桃	9/7頃	9/10頃
黄貴妃（無着色）	9/1頃	9/4頃
選抜白根白桃（岩戸系）	9/5頃	9/8頃
在来系白根白桃	9/9頃	9/12頃
ゴールデンピーチ	9/12頃	9/15頃
秀峰（ネクタリン）	9/1頃	9/3頃