



りんご特報 No.3



令和7年4月17日

J A中野市園芸課

J A中野市りんご・もも部会

生育は、ほぼ平年並に経過しています。

展葉期から5月末までが黒星病の重点防除時期です。薬剤散布は、樹全体にしっかりかかるよう徹底しましょう。

(調査地区：平岡) ＊開花以降予想記載

2025 生育：発芽 3/28 展葉：4/10 (予想) 開花：4/25頃 満開：4/28頃 落花：5/5頃

【第3回 定期散布】

＊散布時期は目安です。生育状況により前後する可能性があります。

【定期散布】 散布日

4月 日 ()

散布量

ℓ

散布時期	開花期（4/25前後）ふじの花が1～2輪咲いた時期		
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml	
	ロムダンフロアブル	33ml	（前日、2回）
	ミギワ20フロアブル	25ml	（前日、3回）
対象病害虫	黒星病、うどんこ病、ケムシ類、ハマキムシ類、キリガ類 シャクトリムシ類		
散布量	10a 当たり：400ℓ		
注意事項	【代替】ロムダンフロアブルに代えてサムコルフロアブル 10 の 5,000 倍（前日、3回）でもよい。		

＊栽培日誌の配布について

R7年度から栽培日誌の管理システムが変更となります。（様式も変更されます）

現在、配布に向けての準備を進めております。5月以降、準備が整い次第配布致します。

配布が遅くなり申し訳ございませんが、皆様のご理解をお願い申し上げます。

次面もご覧ください。（第4回定期散布記載）

次回発行予定

5/2

【第4回 定期散布】

【定期散布】散布日

____月 ____日(____)

散布量

_____ℓ

*落花期 ⇒ 樹全体で頂芽花の70～80%落花した日

*散布時期は目安です。生育状況により前後する可能性があります。

散布時期	落花後 (5/5 前後) 目安：前回から10～12日後
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ㊟ カナメフロアブル 25ml (前日、3回)
対象病害虫	黒星病、うどんこ病、赤星病、黒点病
散布量	10a 当たり：400ℓ
注意事項	①【アブラムシ類対策】ウララ DF の2,000倍（14日前、2回）を加用する。 ②カナメフロアブルは劇物登録農薬です。購入の際は印鑑をご持参ください。

『結実確保に向けて』～ふじの人工授粉のポイント～

- ① 人工授粉を実施する時は、気温・湿度・天候等の授粉環境を複合的に考慮する。⇒ 降雨・強風・低温（最高気温20℃以下）・極端な高温（30℃以上）の日は、なるべく避ける。
- ② 開花始めから満開期までが受精能力が高い ⇒ 開花後3～4日以内に授粉すると結実率が高まる。
- ③ 授粉樹（授粉専用樹）の混植割合を増やすことで、結実が安定します。
特に、ふじ単植園は授粉樹を混植しましょう。（今秋に注文書を発行します）

次号、りんご特報No.4（第5回定期散布）から、散布薬剤の欄に「カルシウム資材（カルタス）」を掲載します。

定期散布に混用して定期的にカルシウムを補給し、カルシウム欠乏症・生理障害の発生軽減に努めて下さい。

*カルシウム資材「カルタス」の詳細は別紙注文書をご確認ください。

*注文を希望される方は、別紙注文書の提出をお願いします。