

ナシ特報

10

令和6年8月16日
JA中野市営農センター
JA中野市ナシ部会

- ◆ 引き続き南水では、黒斑病による被害果実を見つけた場合には、除去し園地外にて処理をお願い致します。
- ◆ **【農薬散布時の注意事項】**
 - ①隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないように注意する。
 - ②散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬剤が残らないよう注意する。
- ◆ **西洋梨【無袋】** 薬剤散布は次面をご覧ください。

和梨【有袋・無袋】共通定期防除

有袋：第12回 無袋：第14回 散布薬剤

散布時期	無袋：8/30 前後（前回から約10日後） 有袋：9/1 前後（前回から約10日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ダントツ水溶剤 50g（前日、3回） ストロビードライフロアブル 50g（前日、3回）	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、輪紋病 シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①南水・あきづきの最終散布。			

西洋梨の定期防除

【有袋】：第10回 散布薬剤

散布時期	有袋：9/10 前後（前回から約20日後）	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ダントツ水溶剤 50g（前日、3回） ストロビードライフロアブル 50g（前日、3回）	散布量		ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
注意事項	①ラ・フランス等の最終散布。 ②ストロビードライフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3日前、9回）でもよい。			

【無袋】：第 12 回 散布薬剤

		散布日	月	日
散布時期	無袋：8/25 前後（前回から約 15 日後）	散布量	ℓ	
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g（3 日前、9 回） 劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、3 回）			
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類			
散布量	10a 当たり：600ℓ			

【無袋】：第 13 回 散布薬剤

		散布日	月	日
散布時期	無袋：9/5 前後（前回から約 10 日後）	散布量	ℓ	
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルクートフロアブル 50ml（14 日前、5 回）収穫前規制に注意 エクシレルSE 20ml（前日、3 回）			
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ケムシ類			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
①ベルクートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。 ②ベルクートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるため使用しない。				

【無袋】：第 14 回 散布薬剤

		散布日	月	日
散布時期	無袋：9/15 前後（前回から約 10 日後）	散布量	ℓ	
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ストロビードライフフロアブル 50g（前日、3 回）			
対象病害虫	輪紋病			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
①ラ・フランス等の最終散布。 ②シンクイムシ類対策 ダントツ水溶剤の 2,000 倍（前日、3 回）を加用する。				