

# ナシ特報 ②

令和7年3月28日  
JA中野市営農センター  
JA中野市ナシ部会

本年の初期生育は、平年に比べてやや早まる見込みです。ただし、今後の気象によっては変動する場合がありますので、園地状況を確認のうえ薬剤散布・管理作業を進めて下さい。

(南水：長丘地区 過去開花日 R7 開花予想)

年度	平年	R4	R5	R6	R7
開花期	4/20	4/21	4/10	4/17	4/18頃

【西洋梨の定期防除】  
【各種講習会】  
については次面に記載

## 和梨

和梨 発芽7日後の散布(りん片脱落直前) (再度記載)

散布時期	発芽7日後(4月上旬)	散布日	月	日
散布薬剤	水 97ℓ当たり ICボルドー48Q 3.3kg	散布量		ℓ
対象病害虫	黒星病			
散布量	10a当たり：300ℓ			
注意事項	①散布時期が遅れた場合や散布直後に降雨があると薬害を生じることがあるので注意する。 ②収穫中の作物への飛散には注意する。			

第3回散布薬剤(南水等が1~2分咲いた頃)

散布時期	目安：4/17~22頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤(ハイテンパワー) 10ml サムコルフロアブル10 20ml(前日、3回) トレノックスフロアブル 200ml(30日前、5回) オンリーワンフロアブル 50ml(前日、3回)	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、黒星病、赤星病、ハマキムシ類、ケムシ類			
散布量	10a当たり：350ℓ			
注意事項	① 訪花昆虫保護のため使用薬剤を厳守する。 ② 収穫前や収穫中の作物への飛散に注意する。			

# 西洋梨

(ラ・フランス：長丘地区 過去開花日 R6 開花予想)

年度	平年	R4	R5	R6	R7
発芽期	4/22	4/23	4/10	4/18	4/20頃

## 第2回散布薬剤（ラ・フランス等が1～2分咲いた頃）

散布時期	目安：4/18～23頃	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml サムコルフロアブル10 20ml（前日、3回） トップジンM水和剤 100g（前日、6回）	散布量	ℓ	
対象病害虫	腐らん病、輪紋病、ケムシ類、ハマキムシ類			
散布量	10a 当たり：300ℓ			
注意事項	① 訪花昆虫に十分に注意する。 ② 赤星病対策：オンリーワンフロアブル2,000倍（前日、3回）を加用する。			

## 【南水開花前講習会】の開催について

開催日	集合時間	集合場所	内容
4月11日 (金)	11時00分	南部共選所	・芽すぐりのポイントについて ・人工授粉のポイントについて
	13時30分	R&Cながの中野支社 (旧長印中野) 駐車場	

## 【オイルヒーター・凍霜害対策講習会】の開催について

開催日	集合時間	集合場所	内容
4月9日 (水)	13時30分	平岡共選所	・オイルヒーター使用説明 ・凍霜害対策（燃焼法等）

・オイルヒーターの使用説明（オイルヒーターを購入した方は出席して下さい）

次回特報配布日  
4月17日（予定）