

ナシ特報 ③

令和7年4月17日

J A中野市園芸課

J A中野市ナシ部会

*栽培日誌の配布について

R7年度から栽培日誌の管理システムが変更となります。(様式も変更されます)

現在、配布に向けての準備を進めております。5月以降、準備が整い次第配布致します。

配布が遅くなり申し訳ございませんが、皆様のご理解をお願い申し上げます。

※参考 (南水：長丘地区 生育調査表)

年度	平年	R3	R4	R5	R6	R7
開 花	4/20	4/13	4/21	4/10	4/17	4/20
満 開	4/23	4/19	4/25	4/13	4/20	4/23

次回特報配布日

5月2日(予定)

和 梨 第4回 散布薬剤(前回から15日後)

散布時期	目安：5/5 ～ 10 頃		散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布量	ℓ	
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml			
	劇カナメフロアブル	25ml （前日、3 回）			
対象病害虫	黒斑病、黒星病、赤星病				
散布量	10a 当たり：350 ℓ				
注意事項	① アブラムシ類対策 ウララDF の 2,000 倍（14 日前、2 回）を加用する。 ② 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、リーフマグ 1,000 倍又はグリーンデイズ 1,000 倍を加用する。 ③ カナメフロアブルは劇物です。購入の際は印鑑をお持ちください。				

※参考 (ラ・フランス：長丘地区 生育調査表)

年度	平年	R3	R4	R5	R6	R7
開 花	4/22	4/13	4/23	4/10	4/17	4/21
満 開	4/25	4/18	4/26	4/13	4/20	4/24

西洋梨 第3回 散布薬剤(前回から15日後)

散布時期	目安：5/5 ～ 10 頃		散布日	月	日
散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布量	ℓ	
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml			
	劇モスピラン顆粒水溶剤	25g（前日、3回）			
	トップジン M 水和剤	100g（前日、6回）			
対象病害虫	輪紋病、腐らん病、胴枯病、アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類				
散布量	10a 当たり：400ℓ				
注意事項	① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。				
	② モスピラン顆粒水溶剤は劇物です。購入の際は印鑑をお持ちください。				