

ナシ特報

⑤

令和6年6月4日
JA中野市営農センター
JA中野市ナシ部会

お疲れ様です。ナシ類の生育は、平年に比べて3~5日早い状況です。4月の低温・凍霜害の影響はほぼ無く、結実は全体的に良好です。一部南水園地で低温により浮き皮症状が確認されましたが、摘果にて障害果は除去を行って下さい。

和梨【有袋・無袋】共通定期防除

第7回 散布薬剤

		散布日	月	日
散布時期	無袋：6/15前後（前回から10日後） 有袋：6/20前後（前回から15日後）			
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml ベルコートフロアブル 50ml（14日前、5回） 劇ダイアジノン水和剤 34 100g（14日前、6回）	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、黒星病、輪紋病 シンクイムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアピオンEの2,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。			

和梨【無袋】定期防除

第8回 散布薬剤

		散布日	月	日
散布時期	無袋：6/25前後（前回から10日後）			
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤（ハイテンパワー） 10ml アーデントフロアブル 50ml（前日、3回） ロブドー水和剤 125g（14日前、5回）	散布量		ℓ
対象病害虫	黒斑病、シンクイムシ類、アブラムシ類、カメムシ類、ハダニ類			
散布量	10a 当たり：450ℓ			
注意事項	①【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアピオンEの2,000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。			

次回特報配布日

6月17日（予定）

西洋梨【有袋・無袋】定期防除について

次面をご覧ください

西洋梨【有袋】定期防除

第6回 6月中下旬散布薬剤

散布時期	6/20 前後 (前回から 15 日後)	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml シトラノフロアブル 100ml (30 日前、3 回) 劇ダイアジノン水和剤 34 100g (14 日前、6 回)	散布量	ℓ	
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、コナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
注意事項	①輪紋病対策 袋掛け前に散布する。また輪紋病感染防止のため、散布後 3 日以内に袋をかける。 ②ハダニ類対策：カネマイトフロアブル 1,000 倍 (前日、1 回) を加用する。			

西洋梨【無袋】定期防除

第6回 6月中旬散布薬剤

散布時期	6/15 前後 (前回から 10 日後)	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり ICボルドー412 3.3 kg	散布量	ℓ	
対象病害虫	輪紋病			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
注意事項	【代替】 ICボルドー412 に代えて、オキシラン水和剤の 500 倍 (3 日前、9 回) でもよい。			

第7回 6月下旬散布薬剤

散布時期	6/25 前後 (前回から 10 日後)	散布日	月	日
散布薬剤	水 100ℓ 当たり ICボルドー412 3.3 kg 劇ダイアジノン水和剤 34 100g (14 日前、6 回)	散布量	ℓ	
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、アブラムシ類、コナカイガラムシ			
散布量	10a 当たり：600ℓ			
注意事項	【代替】 ICボルドー412 に代えて、オキシラン水和剤の 500 倍 (3 日前、9 回) でもよい。			