

# ナシ特報 ⑨

令和6年8月2日  
JA中野市営農センター  
JA中野市ナシ部会

- ◆ 本年の生育は、全体的に平年に比べて2~3日早い状況です。また今後の気象によっては、成熟が早まる可能性があるためご注意ください。
- ◆ 南水では、一部園地で黒斑病の被害果実を確認しました。被害果実を見つけた場合は、除去し園地外にて処理をお願い致します。

## 和梨【有袋・無袋】共通定期防除

次回特報配布日

8月16日(予定)

有袋：第11回 無袋：13回 散布薬剤

散布時期	無袋：8/15前後(前回から約10日後) 有袋：8/20前後(前回から約15日後)	散布日 月 日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤(ハイテンパワー) 10ml エクシレルSE 20ml(前日、3回) ナリアWDG 50g(前日、3回)	散布量 ℓ
対象病害虫	黒斑病、輪紋病 シンクイムシ類、ハマキムシ類、ケムシ類	
散布量	10a当たり：450ℓ	
注意事項	①豊水等の最終散布。 ②ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるため飛散しないように注意する	

## 西洋梨【有袋・無袋】共通定期防除

有袋：第9回 無袋：第11回 散布薬剤

散布日 月 日

散布量 ℓ

散布時期	無袋：8/10前後(前回から約10日後) 有袋：8/20前後(前回から約20日後)	散布日 月 日
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤(ハイテンパワー) 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g(3日前、9回) ⓈイカズチWDG 66g(前日、3回)	散布量 ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10a当たり：600ℓ	
注意事項	①オーロラ等の最終散布。 ②ハダニ類対策：コロマイト乳剤の1,000倍(前日、1回)を加用する。 ③キノンドー顆粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル2,000倍(14日前、5回)でもよい。 なお、ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。	