

# プラム・プルーン特報 No.10

令和6年7月16日  
 JA中野市営農センター  
 JA中野市プラム部会

- 紅りょうぜんの出荷開始予想は、7/8,静香の収穫開始予想は、7/10で、昨年より3日程進んでいます。園地の成熟状況を良く確認し、収穫遅れのないようご注意ください。
- スモモヒメシンクイ第1世代が増加傾向です。10日間隔以内の薬剤散布を徹底し、被害果実は園外で処分して下さい。

## プラム【第12回 定期防除】

対象病害虫：灰星病（すす点病）アブラムシ類（シンクイムシ類）

散布時期	・7月24日～8月2日（第11回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____)
	展着剤（まくぴか） 20mℓ	
	フリントフロアブル25 50mℓ（前日、2回）	
	劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、2回）	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	①【黒斑病(かいよう病)対策】 バリダシン液剤5の500倍（3日前、4回）を加用する。	

## プラム【第13回 定期防除】 対象病害虫：シンクイムシ類

散布時期	・8月3日～8月12日（第12回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____)
	展着剤（まくぴか） 20mℓ	
	劇イカズチWDG 66g（前日、2回）	
散布量	500ℓ / 10a	

裏面もご覧ください

## 2. プルーン

【第9回 定期防除】対象病害虫：灰星病（すす点病）アブラムシ類（シンクイムシ類）

散布時期	・7月24日～8月3日（第8回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水	100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____) 散布量 _____ℓ
	フリントフロアブル25	50mℓ	（前日、2回）
	劇バリアード顆粒水和剤	50g	（前日、2回）
散布量	500ℓ / 10a		
注意事項	①【ハダニ類対策】カネマイトフロアブルの1,000倍（3日前、1回）を加用する。		

### ●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査結果について

\*第1世代が増加傾向です。防除間隔10日以内での薬剤散布を徹底して下さい。

年	一本木		倭	
2024年	R6	R5	R6	R5
5月8日	12	72	36	61
5月15日	14	24	32	40
5月22日	28	69	56	28
5月29日	11	23	17	9
6月5日	2	15	2	3
6月12日	14	12	3	5
6月19日	3	17	8	7
6月26日	14	33	27	37
7月3日	34	46	57	43

\*調査機関：北信農業農村支援センター 数字はスモモヒメシンクイ成虫の誘殺数

次回特報発行予定日：8月上旬頃 問合せ先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）