

プラム・プルーン特報 No.11

令和6年8月1日
 JA中野市営農センター
 JA中野市プラム部会

- 本年は収穫開始から果肉軟化が早い傾向です。収穫期を迎えた品種は、収穫遅れのないように日々園地確認お願い致します。
- スモモヒメシンクイの発生が散見されます。第2世代が8月上旬頃に発生のピークを迎えると予想されます。引き続き、10日間隔以内の薬剤散布を徹底し被害果実は園外で処分して下さい。

プラム【第14回 定期防除】

対象病害虫：灰星病（すす点病）ハダニ類、シンクイムシ類（ケムシ類）

散布時期	・8月13日～8月22日（第13回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】 散布日 ____月 ____日(____)
	展着剤（まくぴか） 20mℓ	
	パレード15フロアブル 50mℓ（前日、2回）	
	アーデントフロアブル 50mℓ（前日、3回）	
散布量	500ℓ / 10a	

プラム【第15回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類

散布時期	・8月23日～9月1日（第14回定期散布から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】 散布日 ____月 ____日(____)
	展着剤（まくぴか） 20mℓ	
	オンリーワンフロアブル 50mℓ（前日、3回）	
	劇モスピラン顆粒水溶剤 50g（前日、3回）	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	果粉溶脱、果実汚れが心配される場合は、モスピラン顆粒水溶剤に代えてエクシレルSEの2500倍（前日、3回）を使用する。	

次面もご覧ください

2. プルーン

【第10回 定期防除】対象病害虫：灰星病、ハダニ類、シンクイムシ類

散布時期	・8月4日～8月13日（第9回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____)	
		散布量 _____ℓ	
	パレード15フロアブル	50ml	(前日、2回)
	アーデントフロアブル	50ml	(前日、3回)
散布量	500ℓ / 10a		

【第11回 定期防除】対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・8月14日～8月23日（第10回定期散布から10日後）		
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____)	
		散布量 _____ℓ	
	オンリーワンフロアブル	50ml	(前日、3回)
	エクシレルSE	40ml	(前日、3回)
散布量	500ℓ / 10a		
注意事項	【晩生種 灰星病・シンクイムシ類対策】 9月上旬に、オーシャインフロアブルの3,000倍（前日、3回）と ④モスピラン顆粒水溶剤の2,000倍（前日、3回）を特別散布する。		

●スモモヒメシンクイ フェロモントラップ調査結果について

年	一本木		倭	
2024年	R6	R5	R6	R5
6月26日	14	33	27	37
7月3日	28	46	48	43
7月10日	34	52	57	38
7月17日	15	38	27	27
7月24日	8	30	20	19

*調査機関：北信農業農村支援センター 数字はスモモヒメシンクイ成虫の誘殺数

次回特報発行予定日：8月中旬頃 問合せ先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）