

プラム・プルーン特報 No.7

令和6年6月3日
JA中野市営農センター
JA中野市プラム部会

摘果作業お疲れ様です。生育状況は、平年よりも4~5日進んでいると思われます。
結実した果実を無事に収穫できるよう、今後の管理作業・防除の徹底をお願いします。
引き続き、シンクイムシ類の重点防除となります。授粉樹も含め、死角がないように散布しましょう。

1. プラム【第8回 定期防除】(2回分の防除を掲載)

対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・6月14日~6月23日 (第7回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____) 散布量 ____ℓ
	展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ	
	ベルコートフロアブル 50mℓ (3日前、3回) エクシレルSE 40mℓ (前日、3回)	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	①【黒斑病(かいよう病)対策] バリダシン液剤5の500倍(3日前、4回)又は スターナ水和剤の1,000倍(7日前、3回)を加用する。	

5/28 スモモヒメシンクイ発生状況(フェロモントラップ調査) *()内、前回 5/22 調査

数 一本木 - 11↓頭 (28) 倭 - 17頭↓(56)

【重要】シンクイムシ類の被害果は、園外へ除去し処理をお願いします。

次面もご覧ください

プラム【第9回 定期防除】

対象病害虫：灰星病、アブラムシ類、シンクイムシ類、

散布時期	・ 6月24日～7月3日 (第8回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】 散布日 ____月 ____日(____) 散布量 _____ℓ
	展着剤 (ハイテンパワー) 10mℓ	
	オンリーワンフロアブル 50mℓ (前日、3回)	
	劇バリアード顆粒水和剤 50g (前日、2回)	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	①【黒斑病(かいよう病)対策] バリダシン液剤5の500倍(3日前、4回)又は スターナ水和剤の1,000倍(7日前、3回)を加用する。	

2. プルーン

【第5回 定期防除】 対象病害虫：灰星病、炭そ病、アブラムシ類、シンクイムシ類、

散布時期	・ 6月11日～6月20日 (第4回の散布から14日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】 散布日 ____月 ____日(____) 散布量 _____ℓ
	展着剤 (ハイテンパワー) 10mℓ	
	フリントフロアブル25 50mℓ (前日、2回)	
	サイアノックス 水和剤 100g (21日前、2回)	
散布量	500ℓ / 10a	

次回特報発行予定日：6月中旬予定

問合せ先：園芸課・担当 横田 (080-5147-8257)