

プラム・プルーン特報 No.8

令和6年6月14日
JA中野市営農センター
JA中野市プラム部会

- 結実が確保されている園地は、仕上げ摘果・見直し摘果を進めて下さい。
- 中野市管内全体的にスモモヒメシンクイの発生は落ち着いていますが、園内の発生状況を確認して、被害果実は、直ちに除去し、園外で処分してください。この時期にシンクイムシの密度を抑える事が、最重要防除となります。◎収穫開始予想を更新しましたので、ご確認下さい。(平年比▲3~4日。裏面に記載)
- ◎今回以降の展着剤は、機能性展着剤まくぴかの5,000倍を使用する。
(湿展性改善、果粉溶脱、果実汚染防止、など)

1. プラム【第10回 定期防除】

対象病害虫：灰星病、アブラムシ類、(シンクイムシ類)

散布時期	・7月4日~7月13日 (第9回定期散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____)
	展着剤(まくぴか) 20mℓ	
	劇バイスロイドEW 33mℓ (14日前、2回)	
	ベルコートフロアブル 50mℓ (3日前、3回)	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	①今回以降の展着剤は、機能性展着剤まくぴかの5,000倍を使用する。 (湿展性改善、果粉溶脱、果実汚染防止、など) ②紅りょうぜん等の収穫時期が近い品種は、バイスロイドEWに代えて アルバリン顆粒水溶剤の2000倍(前日、3回)を使用する。	

6/5 スモモヒメシンクイ発生状況(フェロモントラップ調査) *()内、前回5/28調査数

一本木 - 2↓頭 (11) 倭 - 2頭↓ (17)

【重要】シンクイムシ類の被害果は、園外へ除去し処理をお願いします。

次面もご覧ください

2. プルーン

【第6回 定期防除】対象病害虫：灰星病、(炭そ病)、アブラムシ類、(カメムシ類)
(シンクイムシ類)

散布時期	・6月24日～7月3日 (第5回定期散布から14日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____) 散布量 _____ℓ
	展着剤 (ハイテンパワー) 10mℓ	
	劇バイスロイドEW 33mℓ (14日前、2回)	
	パレード15フロアブル 50mℓ (前日、2回)	
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	【ナミハダニ対策】 ダニコングフロアブルの2,000倍 (前日、1回)を加用する。	

【第7回 定期防除】対象病害虫：灰星病、(すす点病) シンクイムシ類、ケムシ類

散布時期	・7月4日～7月13日 (第6回の散布から10日後)	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____) 散布量 _____ℓ
	展着剤 (ハイテンパワー) 10mℓ	
	ベルコートフロアブル 50mℓ (3日前、3回)	
	エクシレルSE 40mℓ (前日、3回)	
散布量	500ℓ / 10a	

●管理作業

☆新梢生長が旺盛な園地が散見されます。樹冠内部まで光が入るよう、新梢管理を徹底して下さい。

☆笠掛け(貴陽、太陽、シナノパール等)は6月下旬～7月上旬を目安に実施する。

●収穫開始予想

「南部地域」で、平年より3～4日早くなると予想されます。

- ・大石早生 - 6月25日頃
- ・サンタス - 7月20日頃
- ・紅りょうぜん - 7月10日頃
- ・菅野中生 - 7月15日頃

次回特報発行予定日：7月上旬予定

問合せ先：園芸課・担当 横田 (080-5147-8257)