



果樹特報 No.8

令和6年8月15日
JA中野市営農センター
JA中野市りんご・もも部会

病害防除は予防散布が基本となりますので、散布予定日に降雨が予想される場合は前倒して散布してください。

【第13回 定期散布】

*散布時期は目安です。生育状況により前後する可能性があります。

【定期散布】散布日	____月 ____日(____)
散布量	_____ℓ

散布時期	8/31~9/7 *前回から14日以内
散布薬剤	水 100ℓ当たり 展着剤(ハイテンパワー) 10ml 劇バフラン液剤25 50ml (前日、3回) ディアナWDG 10g (前日、2回)
対象病害虫	すず点病、すず斑病、斑点落葉病、褐斑病、(黒星病) シンクイムシ類、キンモンホソガ
散布量	600ℓ/10a
注意事項	①【リンゴワタムシ対策】ディアナWDGに代えて、ダントツ水溶剤の2,000倍(前日、3回)を使用する。 ②バフラン液剤25は劇物登録農薬です。購入の際は印鑑をご持参ください。 ③【ハダニ対策】アカリタッチ乳剤の2,000倍(前日、-)を加用する。

● 中生種(少量品種)の収穫について

着色のみならず、鮮度・食味・日持ち性を考慮し、収穫を開始してください。量がまとまらない場合はコンテナ出荷になります。ご了承ください。

- ①シナノドルチェ(収穫開始見込:9/1頃):果肉軟化が早い特性がありますので収穫遅れに注意して下さい。
- ②すわっこ(収穫開始見込:9/1~10頃):蜜入りすると、早期に果肉褐変する傾向があります。収穫遅れにご注意ください。
- ③千秋(収穫開始見込:9/13頃):一定の着色が乗った果実から順次収穫を開始してください。
- ④シナノピッコロ(収穫開始見込:9/5~15頃):一定の着色が乗った果実から順次収穫を開始してください。

次面もご覧ください。(特別散布 他)

【特別散布】

【特別散布】散布日

____月 ____日(____)

散布量

_____ℓ

*散布時期は目安です。生育状況により前後する可能性があります。

散布時期	9/14～9/21 *前回から 14 日以内
散布薬剤	水 100ℓ 当たり 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml ストライド顆粒水和剤 66g (前日、3回)
対象病害虫	炭素病、斑点落葉病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒星病
散布量	600ℓ / 10a
注意事項	①【薬害注意】ストライド顆粒水和剤は、高温時に散布すると薬害が生じる恐れがある。また、かぶれやすい体質の方は接触に注意する。

● りんご着色資材の使用例

高温により着色遅れが心配されますので、下記資材を参考に定期散布に加用してください。

- ・対象：シナノスイート、ふじ等
- ・下記資材はすべて定期散布に混用可能です。選択により使用してください。

商品名	使用時期	倍率	使用時期	単価/規格
彩色甘味 (おすすめ!)	着色促進 糖度向上	1,000	9月上旬～10月初旬 *収穫予定日 40 日前と 20 日前	3,450 円/500g
メリット赤	着色促進 樹勢調整	300	9月上旬～10月初旬 *収穫 2 か月前から 3 回散布	8,260 円/6 kg
モーニングエース	着色促進 品質向上	500	9月上旬～10月初旬 *収穫 20～25 日前	6,230 円/500g
葉友	着色促進 花芽充実	2,000	9月上旬～10月初旬 *収穫予定 2 か月前から 3 回散布	4,360 円/1 ℓ

● 使用例

- ① 彩色甘味：9月上旬・下旬の2回散布 ⇒ シナノスイート等対象
- ② 彩色甘味：9月下旬・10月初旬の2回散布 ⇒ ふじ対象
- ③ モーニングエース：9月中旬・10月初旬（反射マルチ敷き前）に500倍で2回散布 ⇒ ふじ対象
- ④ メリット赤：9月上旬・中旬・下旬に300倍で3回散布 ⇒ ふじ・シナノスイート等対象
- ⑤ 葉友：9月上旬・中旬・下旬に2,000倍で3回散布 ⇒ ふじ・シナノスイート等対象