



## 定期散布を徹底し、高品質な柿を生産しましょう！

R6 年生育状況（平岡） 開花日：5/21 満開日：5/25  
本年も中野市全体的に花の量は多くついています。隔年結果にならないよう樹の様子を見ながら早めに摘果（着果量の調整）を行ってください。

### 病害虫防除

#### ◎7月上旬（7月5日頃まで）の薬剤散布

●収穫前や収穫中の作物に飛散しないよう、十分注意する。

散布薬剤	水	100ℓ 当たり	散布日 月 日 散布量 ℓ (前日、3回)
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml	
	スコア顆粒水和剤	33g	
対象病害虫	落葉病、炭そ病、うどんこ病		
散布量	500ℓ / 10a *若木の場合、樹体に十分かかる量を散布する。		
注意事項	①【すす点病対策】スコア顆粒水和剤に代えて、ベルコート水和剤の 1,500 倍（14 日前、3 回）を使用する。 ②【カイガラムシ対策】カイガラムシの発生が多い場合は、コルト顆粒水和剤の 2,000 倍（前日、3 回）を加用する。 ③【カキノハタムシガ対策】昨年、カキノハタムシガが発生した園地ではスミチオン水和剤 40 の 800 倍（30 日前、3 回）を加用する。		

防除の際は必ず栽培日誌に記帳しましょう

次回（予定）：7月1日