



# ぶどう特報 #5



2024年5月16日  
JA 中野市園芸課  
JA 中野市ぶどう部会

梅雨期間は主要病害感染拡大が最も心配されます。概ね 10 日間隔で定期防除を進め、散布死角が発生しないように注意してください。下草の草刈りや新梢管理による耕種的防除も有効です。



参考：日曹フラスター液剤 HP↑

| 年度          | 巨峰開花  | シャイン開花 | 特記                  |
|-------------|-------|--------|---------------------|
| 平年          | 6/5   | 6/12   | 過去 10 年平均値 (H26~R5) |
| 2023 年 (R5) | 6/7   | 6/13   | 生育停滞により開花平年より遅れる    |
| 2024 年 (R6) | 6/1 頃 | 6/4 頃  | 昨年比-7 日程度の見込み       |

## 【5月中旬の定期散布 \*共通】

|       |  |                                   |
|-------|--|-----------------------------------|
| 散布時期  | 展葉 9 枚目頃 シャインマスカット他散布目安 5/22~27<br>*生育状況を確認して散布  | 巨峰・ナガノパープル他<br>散布日：5月 日<br>散布量： l |
| 散布薬剤  | 水 100 l<br>展着剤 (ハイテンパワー) 10 ml<br>ドーシャスフロアブル 50 ml (60 日前・3 回)<br>グリーンデイズ 等 100 g (*葉面散布剤) | シャインマスカット他<br>散布日：5月 日<br>散布量： l  |
| 散布量   | 300 l / 10a  |                                   |
| 適用病害虫 | べと病、晩腐病、黒とう病   |                                   |
| 注意事項  | ① カスミカメムシ類・カイガラムシ類対策：コルト顆粒水和剤 3,000 倍 (前日、3 回) を加用する。特にカスミカメ類は、下草刈り後の薬剤散布が効果高い。            |                                   |

## 【5月中旬の散布 \*種なし共通】

|      |  |                                   |
|------|--|-----------------------------------|
| 散布時期 | 展葉 9 枚目頃<br>*満開予定日の 14 日前~   | 巨峰・ナガノパープル他<br>散布日：5月 日<br>散布量： l |
| 散布薬剤 | 水 100 l<br>展着剤 (ハイテンパワー) 10 ml<br>ストマイ液剤 20 100 ml (満開予定日の 14 日前~開花始期・1 回)   | シャインマスカット他<br>散布日：5月 日<br>散布量： l  |
| 散布量  | 300 l / 10a  |                                   |
| 使用目的 | 無種子化   |                                   |
| 注意事項 | ① 隣接に有核巨峰ある場合は絶対に飛散しないようにする。(無種子化)<br>② 満開予定の 14 日前は概ね展葉 9 枚目頃に該当するので、生育状況を確認し、早めに散布完了する。<br>③ 品種間で開花時期が異なるため、混植園では開花状況を確認して散布する。<br>④ 花穂にしっかりと薬剤がかかるように丁寧に散布する。<br>(散布量が少ないと種混入の恐れあり) |                                   |

裏面もお読みください。(フラスター・開花直前の散布を記載)

【5月中下旬の散布】

|      |   |  |
|------|---|--|
| 散布時期 | 展葉 7~11 枚頃  | 品種名： _____<br>散布日： _____ 月 _____ 日<br>散布量： _____ ℓ   |
| 散布薬剤 | 水 100 ℓ<br>展着剤（ハイテンパワー） 10 ml<br>フラスター液剤（新梢展開葉 7~11 枚時・2回）<br>シャインマスカット 50 ml<br>クイーンルージュ® 50 ml<br>種なし巨峰 100 ml<br>ナガノパープル・ピオーネ等 125~200 ml<br>有核巨峰 125~200 ml | 品種名： _____<br>散布日： _____ 月 _____ 日<br>散布量： _____ ℓ   |
|      | 散布量   | *手散布：100~150 ℓ / 10a      *SS 散布：300 ℓ / 10a<br>品種名： _____<br>散布日： _____ 月 _____ 日<br>散布量： _____ ℓ |
| 使用目的 | 着粒増加・新梢伸長抑制   |  |
| 注意事項 | ① 品種により倍率が異なるため、散布前に必ず登録内容（ラベル等）を確認する。<br>② 有核巨峰：展着剤ハイテンパワーに代えてアプローチB I 500 倍を使用する。<br>③ 弱樹勢樹や若木等は新梢伸長が弱る可能性があるため、散布を控える。                                       |  |

【5月下旬の定期散布 \*共通】 前回から 10 日後

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 散布時期  | 開花直前 シャインマスカット他散布目安 5/31~6/3<br>*生育状況を確認して散布   | 巨峰・ナガノパープル等<br>散布日： _____ 月 _____ 日<br>散布量： _____ ℓ         |
| 散布薬剤  | 水 100 ℓ<br>展着剤（ハイテンパワー） 10 ml<br>パレード 15フロアブル 50 ml（7 日前・2 回）<br>オーソサイド水和剤 80 125g（30 日前・3 回）<br>トクチオン水和剤 125g（45 日前・3 回）<br>グリーンデイズ 等 100 g（※葉面散布剤） | シャインマスカット・クイーンルージュ等<br>散布日： _____ 月 _____ 日<br>散布量： _____ ℓ |
| 散布量   | 400 ℓ / 10a  |   |
| 適用病害虫 | べと病・灰色かび病・晩腐病・褐斑病・黒とう病・アザミウマ類・コナカイガラムシ類  |   |
| 注意事項  | ① 主幹害虫対策：主幹・主枝にも薬液が到達するようにする<br>② アザミウマ類対策：花穂（軸部）にも薬液が到達するようにする。   |   |

8月上旬に栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください。

開花前の新梢管理について

伸長が旺盛な新梢は、肥大不足や成熟停滞等の影響が心配されるため、開花期前後に摘芯を実施しましょう。

目安時期：開花直前~満開まで \*展葉 10~13 枚頃

- ① 房に養分を集中させるため、伸長が 1m 以上ある強い新梢は必ず摘芯を実施する。
- ② 房切りが完了した枝の先端を切除する。⇒ **新梢先端を軽く摘み落とす程度**

注意点：伸長が旺盛な新梢に対し強すぎる摘芯をかけると、開花中に副梢が伸長するため注意する。



特報#6：6/1 付け発行予定。

落花直後・落花 10 日後の定期散布等記載予定