



ぶどう特報 #9



2024年7月16日
JA 中野市園芸課
JA 中野市ぶどう部会

【8月上旬の定期散布 *共通】

散布時期	前回から 10 日後	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ
散布薬剤	水 100 ℓ	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ
	展着剤（アピオン-E） 50 ml		
	IC ボルドー-66D 2.5 kg（-・-）		
	テルスター水和剤 100g（14 日前・1 回）		
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病、チャノキイロアザミウマ		
注意事項	① 【コガネムシ類対策】テルスター水和剤に代えて、劇イカズチ WDG1,500 倍（21 日前・5 回）を使用してもよい。ただし、早生種（ナガノパープル等）は収穫前規制に注意する。		

【8月中旬の定期散布 *共通】

散布時期	前回から 10 日後	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ
散布薬剤	水 100 ℓ	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ	品種名： _____ 散布日： 月 日 散布量： _____ ℓ
	展着剤（アピオン-E） 50 ml		
	IC ボルドー-66D 2.5 kg（-・-）		
散布量	400 ℓ / 10a		
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病		
注意事項	① 【ボルドー液代替】IC ボルドー-66D に代えて、ムッシュボルドー-DF の 500 倍又はコサイド 3000 の 2,000 倍又は園芸ボルドーの 500 倍を使用してもよい。ただし、変更する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。		

8月上旬に栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください

特報#10 8/1 付け発行予定。8月下旬・9月上旬定期散布記載予定。
栽培日誌発行予定。