



ぶどう特報

#2



2025 年 3 月 28 日
JA 中野市営農センター
JA 中野市ぶどう部会

発芽は平年並み～平年よりやや早い生育予想です。発芽前は土壤乾燥等による結果母枝の枯れ込み・発芽不良・生育の不揃いが心配されます。園地の保水は早め実施してください。また、樹体観察を適宜行い、休眠期・発芽前の防除を適期に実施してください。

年度	巨峰発芽	シャイン発芽	特記
平年	4/24	4/27	過去 10 年平均値（H27～R6）
2024 年（R6）	4/22	4/23	例年になく品種間の生育差がない年
2025 年（R7）	4/23 頃	4/26 頃	平年並み～平年よりやや早い生育予想。

＊参考：桜開花予想（日本気象協会 3/21 発表） 4/10（平年 4/11）

【第 1 回 定期散布 ＊対象：巨峰・ナガノパープル等】

散布時期	発芽直前 ＊4 月下旬頃	散布日：4 月 日
散布薬剤	水 100 ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10 ml パスポート顆粒水和剤 400g（休眠期・1 回）	散布量： ℓ
散布量	300 ℓ／10a	
適用病害虫	晩腐病・黒とう病	
注意事項	① 晩腐病密度抑制のため、発芽前に散布完了する。	

【第 1 回 定期散布 ＊対象：シャインマスカット・クイーンルージュ®等】

散布時期	発芽直前 ＊4 月下旬頃	散布日：4 月 日
散布薬剤	水 100 ℓ 展着剤（ハイテンパワー） 10 ml 劇デランフロアブル 500 ml（休眠期・1 回）	散布量： ℓ
散布量	300 ℓ／10a	
適用病害虫	黒とう病・晩腐病	
注意事項	① 【注意】デランフロアブルは葉焼けなどの薬害が発生するため、発芽前に散布完了する。	

次回特報（予定）：4 月 17 日頃 カイガラムシ類特散・発芽直後・展葉 3 枚目の定期散布