



2025年 西洋梨【有袋版】病害虫防除暦

JA 中野市営農センター

JA 中野市ナシ部会

◆ 無袋栽培専用防除暦は裏面をご覧ください。

| 散布日 | 散布時期 | 使用薬剤名 | 使用量 | 収穫前 使用 時期 | 年間 使用 回数 | 散布量 ℓ/10a | 対象病害虫 | 注 意 事 項 |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---|--|
| 月 日 | 第1回 3月下旬 (発芽前) | (水88ℓ) スプレーオイル 石灰硫黄合剤 | 2ℓ 10ℓ | 発芽前 発芽前 | — — | 300 | 腐らん病 ハダニ類 カイガラムシ類 | ① 混用順:スプレーオイルに石灰硫黄合剤を加用し、よく攪拌する。 ② 石灰硫黄合剤に代えて、トップジン M 水和剤の1,000倍(前日、6回)でもよい。 |
| 月 日 | 第2回 開花期 4月下旬 | 展着剤 (ハイテンパワー) サムコルフロアブル10 トップジン M 水和剤 | 10mℓ 20mℓ 100 g | 前日 前日 | 3回 6回 | 300 | 腐らん病 輪紋病 ケムシ類 ハマキムシ類 | ① 訪花昆虫に十分に注意する。 ② 赤星病対策 オンリーワンフロアブル 2,000倍(前日、3回)を加用する。 |
| 月 日 | 第3回 5月上旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) モスピラン顆粒水溶剤 トップジン M 水和剤 | 10mℓ 25 g 100 g | 前日 前日 | 3回 6回 | 400 | 輪紋病・腐らん病 胴枯病 アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類 | ① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。 |
| 月 日 | 第4回 5月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) トランスフォームフロアブル ジマンダイセン水和剤 | 10mℓ 50mℓ 200 g | 前日 30日前 | 3回 5回 | 400 | 輪紋病 アブラムシ類 カイガラムシ類 | ① アブラムシ類の発生が目立つ場合は今回の散布を早める。 |
| 月 日 | 第5回 6月上旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) キノドー顆粒水和剤 オリオン水和剤 40 | 10mℓ 100 g 100 g | 3日前 3日前 | 9回 2回 | 500 | 輪紋病 シンクイムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類 ケムシ類 | ① カイガラムシ類(幼虫)対策 アプロードフロアブルの1,000倍(30日前、2回)を加用する。 ② カメムシ類対策 オリオン水和剤 40 に代えて、アルバリン顆粒水溶剤の2,000倍(前日、3回)を使用する。 |
| 月 日 | 第6回 6月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) シトラノフロアブル ダイアジノン水和剤 34 | 10mℓ 100mℓ 100 g | 30日前 14日前 | 3回 6回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 コナカイガラムシ | ① 輪紋病対策 袋掛けの前に散布する。また、輪紋病感染防止のため、散布後3日以内に袋をかける。 |
| 月 日 | 特別散布 7月初旬 | 展着剤 (ハイテンパワー) オキシラン水和剤 | 10mℓ 200 g | 3日前 | 9回 | 600 | 輪紋病 | 🌿 輪紋病対策 袋掛けが遅れている場合は、今回の特別散布を実施する。散布時期は前回より10日後を目安とする。 |
| 月 日 | 第7回 7月上旬 (前回20日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) バイスロイド EW ナリアWDG | 10mℓ 50mℓ 50 g | 7日前 前日 | 2回 3回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類 | ① ナリア WDG は、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。 |
| 月 日 | 第8回 7月下旬 (前回20日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) マイトコーネフロアブル キノドー顆粒水和剤 バリアード顆粒水和剤 | 10mℓ 100mℓ 100 g 50 g | 前日 3日前 前日 | 1回 9回 3回 | 600 | 輪紋病 ハダニ類 シンクイムシ類 カメムシ類 クワコナカイガラムシ | |
| 月 日 | 第9回 8月中旬 (前回20日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) キノドー顆粒水和剤 イカズチ WDG | 10mℓ 100 g 66 g | 3日前 前日 | 9回 3回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 | ① オーロラ等の最終散布。 ② ハダニ類対策 コロマイト乳剤の1,000倍(前日、1回)を加用する。 ③ キノドー顆粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル 2,000倍(14日前、5回)でもよい。なお、ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 |
| 月 日 | 第10回 9月中旬 (前回20日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) ダントツ水溶剤 ストロビードライフロアブル | 10mℓ 50 g 50 g | 前日 前日 | 3回 3回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類 | ① ラ・フランス等の最終散布。 ② ストロビードライフロアブルに代えて、キノドー顆粒水和剤 1,000倍(3日前、9回)でもよい。 |

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル（DF）⇒顆粒水和剤（WDG）⇒水和剤

当防除暦の複製・コピーを禁止します



2025年 西洋梨【無袋版】病害虫防除暦

JA 中野市営農センター

JA 中野市ナシ部会

◆ 有袋栽培専用防除暦は裏面をご覧ください。

| 散布日 | 散布時期 | 使用薬剤名 | 使用量 | 収穫前 使用 時期 | 年間 使用 回数 | 散布量 ℓ/10a | 対象病害虫 | 注 意 事 項 |
|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---|---|
| 月 日 | 第1回 3月下旬 (発芽前) | (水88ℓ) スプレーオイル 石灰硫黄合剤 | 2ℓ 10ℓ | 発芽前 発芽前 | — — | 300 | 腐らん病 ハダニ類 カイガラムシ類 | ① 混用順:スプレーオイルに石灰硫黄合剤を加用し、よく攪拌する。 ② 石灰硫黄合剤に代えて、トップジン M 水和剤の1000倍(前日、6回)でもよい。 |
| 月 日 | 第2回 開花期 4月下旬 | 展着剤 (ハイテンパワー) サムコルフロアブル 10 トップジンM水和剤 | 10mℓ 20mℓ 100 g | 前日 前日 | 3回 6回 | 300 | 腐らん病 輪紋病 ケムシ類 ハマキムシ類 | ① 訪花昆虫に十分に注意する。 ② 赤星病対策 オンリーワンフロアブル 2,000倍(前日、3回)を加用する。 |
| 月 日 | 第3回 5月上旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) モスピラン顆粒水溶剤 トップジン M 水和剤 | 10mℓ 25 g 100 g | 前日 前日 | 3回 6回 | 400 | 輪紋病・腐らん病 胴枯病 アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類 | ① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。 |
| 月 日 | 第4回 5月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) トランスフォームフロアブル ジマンダイセン水和剤 | 10mℓ 50mℓ 200 g | 前日 30日前 | 3回 5回 | 400 | 輪紋病 アブラムシ類 カイガラムシ類 | ① アブラムシ類の発生が見られる場合は今回の散布を早める。 |
| 月 日 | 第5回 6月上旬 (前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) キノド一颗粒水和剤 オリオン水和剤40 | 10mℓ 100 g 100 g | 3日前 3日前 | 9回 2回 | 500 | 輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 ケムシ類 | ① カイガラムシ類対策 アプロードフロアブルの1000倍(30日前、2回)を加用する。 ② カメムシ類対策 オリオン水和剤 40 に代えて、アルバリン顆粒水溶剤の2000倍(前日、3回)を使用する。 |
| 月 日 | 第6回 6月中旬 (前回10日後) | IC ボルドー412 | 3.3kg | — | — | 600 | 輪紋病 | ① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。 |
| 月 日 | 第7回 6月下旬 (前回10日後) | IC ボルドー412 エクシレル SE | 3.3kg 20mℓ | — 前日 | — 3回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 アブラムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類 | ① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。 |
| 月 日 | 第8回 7月上旬 (前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) バイスロイドEW ナリアWDG | 10mℓ 50mℓ 50 g | 7日前 前日 | 2回 3回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類 | ① ナリアWDG は、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。 |
| 月 日 | 第9回 7月中旬 (前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) ベルコートフロアブル | 10mℓ 50mℓ | 14日前 | 5回 | 600 | 輪紋病 | ① ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 |
| 月 日 | 第10回 7月下旬 (前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) マイトコーネフロアブル キノド一颗粒水和剤 ダイアジノン水和剤 34 | 10mℓ 100mℓ 100 g 100 g | 前日 3日前 14日前 | 1回 9回 6回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ハダニ類 | |
| 月 日 | 第11回 8月上旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) キノド一颗粒水和剤 イカズチ WDG | 10mℓ 100 g 66 g | 3日前 前日 | 9回 3回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 | ① キノド一颗粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル 2,000倍(14日前、5回)でもよい。なお、ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 ② ハダニ類対策 コロマイト乳剤の1,000倍(前日、1回)を加用する。 |
| 月 日 | 第12回 8月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) キノド一颗粒水和剤 バリアード顆粒水和剤 | 10mℓ 100 g 50 g | 3日前 前日 | 9回 3回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 | |
| 月 日 | 第13回 9月上旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) ベルコートフロアブル テルスター水和剤 | 10mℓ 50mℓ 100g | 14日前 前日 | 5回 2回 | 600 | 輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類 | ① ベルコートフロアブルに代えて、キノド一颗粒水和剤 1,000倍(3日前、9回)でもよい。 ② ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 |
| 月 日 | 第14回 9月中旬 (前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) ストロビードライフフロアブル | 10mℓ 50 g | 前日 | 3回 | 600 | 輪紋病 | ① ラ・フランス等の最終防除。 ② シンクイムシ対策 ダントツ水溶剤 2000倍(前日、3回)を加用する。 |

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル (DF) ⇒顆粒水和剤 (WDG) ⇒水和剤

当防除暦の複製・コピーを禁止します