

定植前 または 定植時	定植時	アクタラ粒剤5 (IRAC:4A)	植穴処理 1株当り2g	1回	ミカンキイロアザミウマ類
着果促進対策(成りぐせ):トマトーンを50倍に希釈し、開花している花へ散布する。(1花房に1回)					

散布日	散布時期	散布薬剤(水 100ℓ当り)		収穫 前日数	10a 当り 散布量	使用 回数	IRAC コード	FRAC コード	対象病害虫	注 意 事 項
特別 散布	5月 下旬	展着剤(ブレイクスルー) ウララ DF	10ml 50g	前日まで	150ℓ	3回以内	29		アブラムシ類、コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ	害虫の発生が見られたら散布
月 日	6月 月上旬	① 展着剤(ブレイクスルー) ダントツ水溶剤 ダコニール 1000	10ml 50g 100ml	前日まで 前日まで		3回以内 4回以内	4A	M5	コナジラミ類、ミナキイロアザミウマ、 テントウムシダマシ類、カメムシ類、 ハモグリハエ類、アブラムシ類 灰色かび病、黒枯病 すすかび病、うどんこ病	
月 日	6月 中下旬	② 展着剤(ブレイクスルー) ディアナSC ゲッター水和剤	10ml 40ml 100g	前日まで 前日まで		2回以内 5回以内	5	10+1	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 コナジラミ類、アザミウマ類、 ハモグリハエ類 灰色かび病、黒枯病、菌核病	②コナジラミ対策で粘着シート(黄色)を設置する場合は、1aあたり30枚を目安とする。
月 日	7月 月上旬	③ 展着剤(ブレイクスルー) アディオナ乳剤 プロポーズ顆粒水和剤	10ml 50ml 100g	前日まで 前日まで	200ℓ	3回以内 4回以内	3A	40+M5	アブラムシ類、オンジツコナジラミ、 カメムシ類、テントウムシダマシ類 褐色腐敗病、すすかび病	②ハダニの発生が多い場合は、 「コロマイト乳剤」(1,500倍、前 日、2回まで)を加用。
月 日	7月 月中旬	④ 展着剤(ブレイクスルー) コテツフロアブル シグナム WDG	10ml 50ml 66g	前日まで 前日まで		4回以内 3回以内	13	11+7	オオタバコガ、ハダニ類、 ハスモンヨトウ、テントウムシダマシ類、 ミナキイロアザミウマ、ヨトウムシ、 ミカンキイロアザミウマ、チャノホコリダニ うどんこ病、灰色かび病、 菌核病、褐色斑点病 すすかび病	①7月中旬～8月下旬まではオオ タバコガの発生が特に多い時期に なります。散布間隔に注意するとと もに、死角がないように散布する。
月 日	7月 月下旬	⑤ 展着剤(ブレイクスルー) ベルコート水和剤 プレバソンフロアブル5 カネマイトフロアブル	10ml 33g 50ml 100ml	前日まで 前日まで 前日まで		3回以内 2回以内 1回	28 20B	M7	灰色かび病、すすかび病、 うどんこ病 オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ハモグリハエ類、褐紋病 ハダニ類、チャノホコリダニ	①展着剤(ブレイクスルー 10,000倍)を 加えてもよい。
月 日	8月 月上旬	⑥ 展着剤(ブレイクスルー) ダントツ水溶剤 コロマイト乳剤 ドーシャスフロアブル	10ml 50g 66ml 100ml	前日まで 前日まで 前日まで	300ℓ	3回以内 2回以内 4回以内	4A 6	21+M5	テントウムシダマシ類、カメムシ類、 コナジラミ類、ミナキイロアザミウマ、 アブラムシ類、ハモグリハエ類、 ハダニ類、チャノホコリダニ 褐色腐敗病、黒枯病、	①オオタバコガの発生が見られる 場合、「プレオフロアブル」(1,000 倍、前日、4回)を加用。
月 日	8月 中下旬	⑦ 展着剤(ブレイクスルー) ベルコート水和剤 ディアナSC	10ml 33g 40ml	前日まで 前日まで		3回以内 2回以内	5	M7	灰色かび病、すすかび病 うどんこ病 オオタバコガ、アザミウマ類、 ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、 コナジラミ類、	①今回の散布で「ティアナSC」の 使用回数の上限に達する。
月 日	9月 月上旬	⑧ 展着剤(ブレイクスルー) プレバソンフロアブル5 トップジン M 水和剤	10ml 50ml 66g	前日まで 前日まで		2回以内 5回以内	28	1	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、 ハモグリハエ類 灰色かび病、菌核病 黒枯病	①アブラムシ類の発生が見られる 場合、「コルト顆粒水和剤」 (4,000倍、前日、3回)を加用 する。
月 日	9月 月中旬	⑨ 展着剤(ブレイクスルー) コテツフロアブル モレスタン水和剤	10ml 50ml 50g	前日まで 前日まで	4回以内 3回以内	13 UN	M10	オオタバコガ、ハダニ類、 ハスモンヨトウ、チャノホコリダニ、 ミナキイロアザミウマ、ヨトウムシ ミカンキイロアザミウマ テントウムシダマシ類、うどんこ病	①台風などで風雨による病害の感 染が心配される場合は「ゲッ ター水和剤」(1,000倍、前 日、5回)を加用。	
月 日	10月 月上旬	⑩ 展着剤(ブレイクスルー) ダコニール1000	10ml 100ml	前日まで	4回以内		M5	灰色かび病、黒枯病、 すすかび病、うどんこ病	①気温が高くオオタバコガなどの 虫害が心配される場合は、「プレオ フロアブル」(1,000倍、前日、4回) を加用。	

混用順序：展着剤 → 液剤 → 乳剤 → 顆粒水溶剤 → 水溶剤 → フロアブル → ドライフロアブル(DF) → 顆粒水和剤(WDG) → 水和剤

安全・安心な農産物生産のために 防除・使用基準を厳守しましょう

当防除暦の複製・コピーを禁止します