

| 散布日 | 散布時期 | 散布薬剤(水100ℓ当り) | 収穫前 使用時期 | 使用 回数 (以内) | 散布量 ℓ/10a | 対象病虫害 | 注意事項 |
|--------|---------------------------|--|------------------|------------------|--------------|---|--|
| 月 日 | 第1回 発芽前 3月下旬 | (水 98ℓ) キノド一颗粒水和剤 スプレーオイル 100g 2ℓ | 3日前 発芽前 | 9回 — | 300 | 黒斑病・輪紋病・黒星病 カイガラムシ類 ハダニ類 | ① 混用順:キノド一颗粒水和剤にスプレーオイルを加用し、よく攪拌する。 ② 【代替】キノド一颗粒水和剤に代えて石灰硫黄合剤10倍(発芽前、—)でもよい。 |
| 月 日 | 第2回 発芽7日後 4月上旬 | (水 96.7ℓ) IC ボルドー48Q 3.3Kg | 開花前 | — | 300 | 黒星病 | ① 散布が遅れた場合や散布直後に降雨があると薬害が生じることもあるので注意する。 ② 収穫中の作物への飛散に充分注意する。 |
| 月 日 | 第3回 開花期 4月下旬 | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml サムコルフロアブル 10 20ml トレノックスフロアブル 200ml オンリーワンフロアブル 50ml | 前日 30日前 前日 | 3回 5回 3回 | 350 | 黒斑病・黒星病・赤星病 ハマキムシ類・ケムシ類 | ① 散布時期は、1～2分咲を目安に散布する。 |
| 月 日 | 第4回 5月上中旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml カナメフロアブル 25ml | 前日 | 3回 | 350 | 黒斑病・黒星病・赤星病 | ① アブラムシ類対策 ウララ DF2,000倍(14日前、2回)を加用する。 ② 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、リーフマグ 1,000倍又はグリーンデイズ 1,000倍を加用する。 |
| 月 日 | 第5回 5月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml トレノックスフロアブル 200ml トランスフォームフロアブル 50ml | 30日前 前日 | 5回 3回 | 350 | 黒斑病・黒星病・赤星病 アブラムシ類 カイガラムシ類 | ① 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、リーフマグ 1,000倍又はグリーンデイズ 1,000倍を加用する。 |
| 月 日 | 第6回 6月上中旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml アントラコール颗粒水和剤 200g サイアノックス水和剤 100g | 45日前 7日前 | 4回 3回 | 400 | 黒斑病・黒星病・赤星病 シンクイムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ | ① カイガラムシ類対策 アプロードフロアブル 1000倍(30日前、2回)を加用する。 |
| 月 日 | 第7回 6月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml ベルコートフロアブル 50ml ダイアジノン水和剤 34 100g | 14日前 14日前 | 5回 6回 | 450 | 黒斑病・黒星病・輪紋病 シンクイムシ類 コナカイガラムシ ハマキムシ類 アブラムシ類 | ① 袋かけ前の防除とする。 ② 【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアビオン E の 2000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。 |
| 月 日 | 第8回 7月上中旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml アーデントフロアブル 50ml ロブドー水和剤 125g | 前日 14日前 | 3回 5回 | 450 | 黒斑病・黒星病 シンクイムシ類 カメムシ類 ハダニ類 アブラムシ類 | ① 【代替】ロブドー水和剤に代えて、キノド一颗粒水和剤 1000倍(3日前、9回)でもよい。 ② 【代替】通常展着剤に代えて、固着性展着剤のアビオン E の 2000倍を使用すると薬液付着効果が高まる。 |
| 月 日 | 第9回 7月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml ダニコングフロアブル 50ml キノド一颗粒水和剤 100g オリオン水和剤 40 100g | 前日 3日前 3日前 | 1回 9回 2回 | 450 | 黒斑病・黒星病・輪紋病 ハダニ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類 アブラムシ類 | ① シンクイムシ類対策 オリオン水和剤 40に代えて、バリアード顆粒水和剤 2000倍(前日、3回)を使用する。 |
| 月 日 | 第10回 8月上中旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml コロマイト乳剤 100ml ベルコートフロアブル 50ml イカズチ WDG 66g | 前日 14日前 前日 | 1回 5回 3回 | 450 | 黒斑病・黒星病・輪紋病 カメムシ類 シンクイムシ類 ハダニ類 | ① 幸水等の最終散布。 ② 早生種等 【代替】ベルコートフロアブルに代えてキノド一颗粒水和剤 1000倍(3日前、9回)でもよい。 |
| 月 日 | 第11回 8月下旬 (前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml エクシレル SE 20ml ナリアWDG 50g | 前日 前日 | 3回 3回 | 450 | 黒斑病・輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類・ケムシ類 | ① 豊水等の最終散布。 ② ナリア WDG は、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。 |
| 月 日 | 第12回 9月上旬 (前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー) 10ml ダントツ水溶剤 50g ストロビードライフロアブル 50g | 前日 前日 | 3回 3回 | 450 | 黒斑病・輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 コナカイガラムシ類 | ① 南水・あきづき等の最終散布。 |

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル(DF)⇒顆粒水和剤(WDG)⇒水和剤

当防除暦の複製・コピーを禁止します。