

露地・雨よけ

サクランボ特報

No.1

令和7年3月3日
JA中野市営農センター
JA中野市サクランボ部会

本年の発芽は平年並みの予想です。園地内をよく確認して早めの防除に努めましょう。第1回目の防除に向けて、剪定作業・SS 走行路の確保をお願い致します。

今年も、凍霜害が心配されますので、凍霜害対策を講じて下さい。

(平岡)

佐藤錦	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2
発芽日	4/4	4/4?	4/5	3/30	4/7	3/29	3/31

* 発芽前の防除 対象病害虫 カイガラムシ類 (ハダニ類)

散布時期	・発芽前 (3月下旬)		
散布薬剤	水	98ℓ当り	散布日 ____月 ____日 散布量 ____ℓ
	アプロードフロアブル	100mℓ	
	スプレーオイル	2ℓ	
散布量	10a当たり; 300ℓ		
注意事項	①胴枯病対策として発芽前に、石灰硫黄合剤の10倍を単用散布する。 石灰硫黄合剤は、隣接する園地やハウスビニールにかからないように注意する。 ②胴枯病の枝は切り取り焼却する。部分的な場合は削り取り、トップジンMペーストを塗布する。		

* コスカシバ対策 薬剤散布による防除を行なう場合は、下記のいずれかを実施する。

①開花期までに、フェニックスフロアブルの500倍 (開花期まで、1回) を樹幹部および主枝に散布する。(10a当り散布量目安5~200ℓ)

* 凍害対策

3月中旬~下旬の花芽が膨らみ始めた頃から開花期まで、低温遭遇時 (-3℃以下) の花器障害が心配されますので、園内の保温 (燃焼資材の利用、加温設備のある園地では加温機の使用等) により対策を講じて下さい。

次回特報発行予定日: 3月末~4月初旬

内容: 開花前の薬剤散布 他

問合先: 園芸課・担当 横田 (080-5147-8257)