

キウイフルーツ病害虫防除暦



散布日	散布時期	散布薬剤(水100ℓ当り)		収穫前 使用 時期	使用 回数 (以内)	散布量 ℓ/10a	対象病害虫	注意事項
月 日	3月下旬 発芽前	(水90ℓ) 石灰硫黄合剤	10ℓ	発芽前	—	300	越冬病害虫 (カイガラムシ類)	① 石灰硫黄合剤は隣接するハウ スビニールにかからないように する。 ② 【代替】 石灰硫黄合剤に代えてスプ レーオイル 100 倍(発芽前) でもよい。 ③ 剪定跡にはトップジンMペー スト(3回以内)を必ず塗布する。
月 日	5月下旬 開花前	展着剤(ハイテンパワー) アルバリン顆粒水溶剤 アグレプト水和剤	10mℓ 50g 100g	前日 90 日前	3 回 4 回	350	花腐細菌病 かいよう病 カメムシ類	① 主幹部のコウモリガ食入はハ リガネ等で刺殺する。 ② 散布時期を厳守する。(開花前)
月 日	7月上旬	展着剤(ハイテンパワー) ダコニール1000	10mℓ 100mℓ	60 日前	7 回	350	果実軟腐病	
月 日	10月上旬	展着剤(ハイテンパワー) トップジンM水和剤	10mℓ 100g	前日	5 回	350	果実軟腐病	① 収穫前の最終防除。 貯蔵・追熟中の病害の重要な防 除となります。

* 上記以外で、キウイフルーツに登録のある農薬例

農薬名	倍率	収穫前規制	使用回 数	対象病害虫	使用時期
フェニックスフロアブル	4,000	7日前	3回	キイロマイコガ・ケムシ類	5月下旬頃
モスピラン顆粒水溶剤	2,000	7日前	3回	カイガラムシ類	5月下旬頃
ベンレート水和剤	2,000	7日前	5回	果実軟腐病	7月上旬頃
アディオン乳剤	2,000	7日前	5回	カメムシ類・キイロマイコガ	7月下旬から8月下旬

時期	薬剤名	濃度	使用回数	注意事項
開花後20～25日 (6月下旬～7月上旬)	フルメット液剤	2.5ppm (水4ℓに10ml瓶1本)	年間を 通じて 1回のみ	①果実浸漬、または果実散布 ②着果過多の場合、樹勢が低下す る恐れがあるため、適正着果量に する。
開花後25～30日 (6月末～7月上旬)	フルメット液剤	5.0ppm (水2ℓに10ml瓶1本)		

* 処理が遅れると、肥大効果が十分ではなくなります。開花後30日までに処理してください。

* 早い時期に処理する場合は、濃度が濃いと変形果の発生が多くなるので注意しましょう。

6月～7月末で果実の大きさが決まります。土壌の乾燥や摘果遅れ等に注意してください。

混用例: 展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル(DF)⇒顆粒水和剤(WDG)⇒水和剤

安全・安心な農産物生産のために 防除・使用基準を厳守しましょう

当防除暦の複製・コピーを禁止します