



2024年

サクランボ病害虫防除暦

JA中野市営農センター

散布日	散布時期	散布薬剤(水 100ℓ当り)		収穫前 使用時期	使用回数 (以内)	散布量 (ℓ/10a)	対象病害虫 (発生病害虫)	注意事項
月 日	発芽前	① (水98ℓ) アプロードフロアブル スプレーオイル	100mℓ 2ℓ	7日前 発芽前	2回 -	300	(ハダニ類) カイガラムシ類	① 胴枯病の枝は切り取り焼却する。剪定及び患部の削り取り後は、塗布剤を塗布する。 ② (越冬病害虫)の発生が心配される場合は、石灰硫黄合剤の10倍(発芽前)を単用散布する。 * 石灰硫黄合剤は隣接するハウスビニールに飛散しないよう注意する。
* 特別散布コスカシバ発生園は、開花期までにフェニックスフロアブルの500倍(開花期まで、1回・10aあたり5~200ℓ)を樹幹部及び主枝に散布する。								
月 日	4月中下旬 開花直前	② 展着剤(ハイテンパワー) オンリーワンフロアブル	10mℓ 50mℓ	前日	3回	350	灰星病、炭そ病 黒斑病 褐色せん孔病	① ハマキムシ類 発生園は、フェニックスフロアブル 4,000倍(前日、2回)を加用する。
月 日	5月上旬 落花直後 (前回から14日後)	③ 展着剤(ハイテンパワー) サムコルフロアブル 10 ベルコートフロアブル	10mℓ 40mℓ 50mℓ	前日 7日前	3回 3回	400	灰星病 ケムシ類 コスカシバ ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ	① ベルクートフロアブルは5℃以下では固化する場合がありますので、注意する。
月 日	5月中下旬 (前回から14日後)	④ アーデントフロアブル ナリアWDG	25mℓ 50g	前日 前日	3回 3回	500	灰星病 炭そ病 黒斑病 褐色せん孔病 幼果菌核病 オウトウショウジョウバエ (カメムシ類)	① 今回から収穫終了後まで展着剤は使用しない。 ② オウトウショウジョウバエ(カメムシ類)対策 アーデントフロアブルに代えてバイスロイドEWの4,000倍(7日前、2回)を使用する。(果実汚染注意する。) ③ ナリアWDGは、ぶどう(ピオーネ)、洋なし(ル・レクチェ)等に薬害が生じるので、飛散しないようにする。
月 日	6月上旬 (前回から14日後) 高砂、佐藤錦など 最終防除	⑤ オンリーワンフロアブル ディアナWDG	50mℓ 10g	前日 前日	3回 2回	500	灰星病炭そ病 黒斑病 褐色せん孔病 オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類	
月 日	6月中下旬 紅秀峰 最終防除	⑥ ナリアWDG コルト顆粒水和剤	50g 10g	前日 前日	3回 3回	500	灰星病、炭そ病 黒斑病 褐色せん孔病 幼果菌核病 オウトウショウジョウバエ	① ナリアWDGは、ぶどう(ピオーネ)、洋なし(ル・レクチェ)等に薬害が生じるので、飛散しないようにする。
* 特別散布(6月下旬~7月上旬): 灰星病(黒斑病)対策としてパレード15フロアブルの2000倍(前日、2回)を特別散布する。								
月 日	7月上中旬 収穫終了 直後	⑦ 展着剤(ハイテンパワー) トレノックスフロアブル エコマイト顆粒水和剤 ダイアジノン水和剤 34	10mℓ 200mℓ 50g 100g	21日前 7日前 14日前	5回 1回 2回	600	灰星病・炭そ病 幼果菌核病 褐色せん孔病 アブラムシ類 ウメシロカイガラムシ ハマキムシ類 ナミハダニ アメリカシロヒトリ	①【ドリフト注意】 エコマイト顆粒水和剤は、りんご・おうとう以外登録がないので、他品目に飛散しないよう注意する。
月 日	7月下旬 (前回から14日後)	⑧ 展着剤(ハイテンパワー) ダニオーテフロアブル トレノックスフロアブル サイアノックス水和剤	10mℓ 50mℓ 200mℓ 100g	前日 21日前 14日前	1回 5回 2回	600	褐色せん孔病 ハダニ類 ケムシ類 (ハマキムシ類)	①【ダニオーテ散布時の注意事項】 ・銅剤(オキシラン等)と混用しない。 ・銅剤を散布している場合は、銅剤散布後45日間隔を空けてダニオーテを使用する。
月 日	8月上旬 (前回から14日後)	⑨ 展着剤(ハイテンパワー) トレノックスフロアブル サムコルフロアブル 10	10mℓ 200mℓ 40mℓ	21日前 前日	5回 3回	600	灰星病・炭そ病 幼果菌核病 褐色せん孔病 コスカシバ ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ ケムシ類 (アメリカシロヒトリ)	①【ハダニ類対策】 コロマイト乳剤の1,000倍(7日前、1回)を加用する。
月 日	9月上旬	⑩ ICボルドー66D ダイアジノン水和剤 34	2.5kg 100g	- 14日前	- 2回	600	褐色せん孔病 ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ ウメシロカイガラムシ	①【代替】ICボルドー66Dに代えてオキシラン水和剤の600倍(収穫後~落葉期、3回)でもよい。(展着剤加用)

当防除暦の複製・コピーを禁止します

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水和剤⇒水和剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル(DF)⇒顆粒水和剤(WDG)⇒水和剤