

# 2024年 西洋梨【無袋版】病虫害防除暦

JA 中野市営農センター

JA 中野市ナシ部会

| 散布日    | 散布時期                            | 使用薬剤名   | 使用量                                  | 収穫前<br>使用<br>時期            | 年間<br>使用<br>回数         | 散布量<br>ℓ/10a | 対象病虫害  | 注意事項  |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--|---|
| 月<br>日 | <b>第1回</b><br>3月下旬<br>(発芽前)     | (水88ℓ)<br>スプレーオイル<br>石灰硫黄合剤                           | 2ℓ<br>10ℓ                            | 発芽前<br>発芽前                 | —<br>—                 | 300          | 腐らん病<br>ハダニ類<br>カイガラムシ類                                    | ① 混用順:スプレーオイルに石灰硫黄合剤を加用し、よく攪拌する。<br>② 石灰硫黄合剤に代えて、トップジン M 水和剤の1000倍(前日、6回)でもよい。  |
| 月<br>日 | <b>第2回</b><br>開花期<br>4月下旬       | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>サムコルフロアブル 10<br>トップジンM水和剤            | 10mℓ<br>20mℓ<br>100 g                | 前日<br>前日                   | 3回<br>6回               | 300          | 腐らん病<br>輪紋病<br>ケムシ類<br>ハマキムシ類                              | ① 訪花昆虫に十分に注意する。<br>② <b>赤星病対策</b><br>オンリーワンフロアブル 2,000倍(前日、3回)を加用する。  |
| 月<br>日 | <b>第3回</b><br>5月上旬<br>(前回15日後)  | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>モスピラン顆粒水溶剤<br>ベンレート水和剤               | 10mℓ<br>25 g<br>50 g                 | 前日<br>前日                   | 3回<br>4回               | 400          | 輪紋病<br>胴枯病<br>アブラムシ類<br>カメムシ類<br>シンクイムシ類                   | ① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。  |
| 月<br>日 | <b>第4回</b><br>5月下旬<br>(前回15日後)  | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>トランスフォームフロアブル<br>ジマンダイセン水和剤          | 10mℓ<br>50mℓ<br>200 g                | 前日<br>30日前                 | 3回<br>5回               | 400          | 輪紋病<br>アブラムシ類<br>カイガラムシ類                                   | ① アブラムシ類の発生が見られる場合は今回の散布を早める。   |
| 月<br>日 | <b>第5回</b><br>6月上旬<br>(前回10日後)  | 展着剤 (ハイテンパワー)<br><b>サイアノックス水和剤</b><br><b>ラビライト水和剤</b> | 10mℓ<br><b>100 g</b><br><b>200 g</b> | <b>45日前</b><br><b>45日前</b> | <b>3回</b><br><b>3回</b> | 500          | 輪紋病<br>(腐らん病)<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>アブラムシ類<br>クワコナカイガラムシ | ① <b>カイガラムシ類対策</b><br>アブロードフロアブルの1000倍(30日前、2回)を加用する。<br>② <b>カメムシ類対策</b><br>サイアノックス水和剤に代えて、アルバリン顆粒水溶剤の2000倍(前日、3回)を使用する。             |
| 月<br>日 | <b>第6回</b><br>6月中旬<br>(前回10日後)  | IC ボルドー412  | 3.3kg                                | —                          | —                      | 600          | 輪紋病  | ① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。  |
| 月<br>日 | <b>第7回</b><br>6月下旬<br>(前回10日後)  | IC ボルドー412<br>ダイアジノン水和剤 34                            | 3.3kg<br>100 g                       | —<br>14日前                  | —<br>6回                | 600          | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>アブラムシ類<br>コナカイガラムシ                       | ① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の500倍(3日前、9回)でもよい。  |
| 月<br>日 | <b>第8回</b><br>7月上旬<br>(前回10日後)  | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>バイスロイドEW<br>ナリアWDG                   | 10mℓ<br>50mℓ<br>50 g                 | 7日前<br>前日                  | 2回<br>3回               | 600          | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>アブラムシ類                         | ① ナリアWDGは、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。<br>② ハダニ類対策:カネマイトフロアブル 1,000倍(前日、1回)を加用する。  |
| 月<br>日 | <b>第9回</b><br>7月中旬<br>(前回10日後)  | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>ベルコートフロアブル                           | 10mℓ<br>50mℓ                         | 14日前                       | 5回                     | 600          | 輪紋病  | ① ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。  |
| 月<br>日 | <b>第10回</b><br>7月下旬<br>(前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>ダニコングフロアブル<br>キノドー顆粒水和剤<br>オリオン水和剤40 | 10mℓ<br>50mℓ<br>100 g<br>100 g       | 前日<br>3日前<br>3日前           | 1回<br>9回<br>2回         | 600          | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>ハダニ類                           |   |
| 月<br>日 | <b>第11回</b><br>8月上旬<br>(前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>キノドー顆粒水和剤<br>イカズチ WDG                | 10mℓ<br>100 g<br>66 g                | 3日前<br>前日                  | 9回<br>3回               | 600          | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>カメムシ類                                    | ① キノドー顆粒水和剤に代えて、ベルコートフロアブル 2,000倍(14日前、5回)でもよい。なお、ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。<br>② <b>ハダニ類対策</b><br>コロマイト乳剤の1,000倍(前日、1回)を加用する。 |
| 月<br>日 | <b>第12回</b><br>8月下旬<br>(前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>キノドー顆粒水和剤<br>バリアード顆粒水和剤              | 10mℓ<br>100 g<br>50 g                | 3日前<br>前日                  | 9回<br>3回               | 600          | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>カメムシ類                                    |   |
| 月<br>日 | <b>第13回</b><br>9月上旬<br>(前回15日後) | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>ベルコートフロアブル<br>エクシレル SE               | 10mℓ<br>50mℓ<br>20mℓ                 | 14日前<br>前日                 | 5回<br>3回               | 600          | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>ケムシ類<br>ハマキムシ類                           | ① ベルコートフロアブルに代えて、キノドー顆粒水和剤 1,000倍(3日前、9回)でもよい。<br>② ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。  |
| 月<br>日 | <b>第14回</b><br>9月中旬<br>(前回10日後) | 展着剤 (ハイテンパワー)<br>ストロビードライフロアブル                        | 10mℓ<br>50 g                         | 前日                         | 3回                     | 600          | 輪紋病  | ① ラ・フランス等の最終防除。<br>② <b>シンクイムシ対策</b><br>ダントツ水溶剤 2000倍(前日、3回)を加用する。  |

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル（DF）⇒顆粒水和剤（WDG）⇒水和剤

**当防除暦の複製・コピーを禁止します**